



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Florule de Chaudfontaine et de Magnée (Liège), ou Catalogue des plantes qu'on rencontre dans une circonférence d'un rayon de une lieue à une lieue et demie, en prenant cette dernière commune pour centre; par Ch. A. Strail, curé de Magnée.

Quand une localité offre une végétation tant soit peu remarquable, il me semble qu'elle mérite d'être signalée.

J'ai parcouru toute la province de Liège et nulle part je n'ai rencontré autant d'espèces dans un espace aussi restreint que celui-ci.

Le hameau de Magnée est situé à peu près à la jonction de trois systèmes géologiques, savoir : le hervien, le houiller et le condrusien. Ces trois systèmes se rapportent au terrain crétacé et au terrain anthraxifère.

Le premier système consiste principalement en cailloux, calcaire poudingiforme; glauconie, sable glauconifère, marne, smectique et psammite glauconifère. Le second est formé de psammite, schiste et houille, et le troisième de calcaire et dolomie, de psammite et schiste grisâtres.

Les roches y sont à nu, ou recouvertes d'une couche plus ou moins épaisse d'une argile le plus souvent sablonneuse et mêlée de rognons de silex. Il est bien entendu que je n'ai en vue ici que la couche supérieure.

La composition de la terre végétale ou, pour être plus exact, la composition de la surface étant dans ces environs presque partout la même, excepté sur les roches de dolomie, où j'ai toujours trouvé une végétation assez pauvre, probablement à cause d'une trop grande quantité de magnésie dont le sol y est imprégné, je n'ai pas cru devoir mentionner dans ce catalogue la position géolo-

gique des stations où croissent les plantes qui y figurent. Il m'a paru qu'il suffisait d'indiquer que telles plantes croissent dans tels endroits ou humides ou marécageux, que d'autres ne se trouvent que dans tels lieux arides, ou bien sur le calcaire et le schiste, quand ces roches sont à nu ou seulement recouvertes d'une légère couche de terre.

La richesse de la végétation de cette localité dépend tout autant des accidents du terrain et des variations atmosphériques qui en résultent que de sa composition.

La pression plus ou moins grande de l'atmosphère, selon que l'endroit est plus ou moins élevé, la température, l'intensité du refroidissement pendant la nuit, les courants d'air occasionnés par les montagnes et les vallées, et surtout la direction des versants, voilà ce qui, selon mon opinion, a sur la végétation une influence tout aussi grande que la nature du sol, du moins quant aux plantes spontanées, et voilà aussi ce qui mérite une étude spéciale.

Je suis loin de nier que, pour se développer et se perpétuer, un grand nombre de végétaux exigent un sol particulier; par exemple, on ne rencontre nulle part en Belgique le *Thlaspi calaminare*, le *Viola lutea* et l'*Armeria elongata* que sur les terrains ferrugineux et calaminaires d'Oneux et de Welkenraedt; mais à Modave (Condroz) et dans tous les environs de cette même commune, on n'aperçoit pas un seul pied des *Polygonum hydropiper* et *persicaria*, quoique la terre végétale y soit la même qu'ici et qu'elle repose sur les mêmes roches. On doit donc bien souvent rapporter la cause de la rareté ou de l'abondance de certaines espèces dans certains endroits à d'autres influences qu'à celles qui proviennent de la nature du terrain.

M. C. Malaise, professeur à l'Institut agricole de Gembloux, a été mon compagnon de voyage dans beaucoup de mes herborisations, et nous avons trouvé ensemble la plupart de ces plantes.

CH. A. STRAIL.

ABRÉVIATIONS.

A.C. Assez commun.

C.C. Très-commun.

A.R. Assez rare.

R.R. Très-rare.

Ces signes n'ont rapport qu'aux localités désignées. *Etc.*, placé après le nom de la localité, signifie que la plante se trouve aussi dans tous les environs.

RENONCULACÉES.

- Clematis Vitalba* L. — Magnée, etc., les haies et les bois. C.C.
Thalictrum flavum L. — Herstal, oseraies de l'île Moncin. A.C.
Anemone nemorosa L. — Les haies, les bois, les pâturages. C.C.
A. ranunculoides L. — Magnée, lieux ombragés. A.C.
A. sylvestris L. — Vaux-sous-Chèvremont et bois entre Chaudfontaine et Prayon. R.R.
A. Hepatica L. — Chaudfontaine, lieux ombragés. Cette plante était autrefois assez commune dans cette localité.
Adonis autumnalis L. — On rencontre assez souvent cette plante le long des haies.
Ranunculus hederaceus L. — Saint-Hadelin (Olne), lieux inondés et ruisseaux ou hameau appelé *Sur-les-Frehises*. A.C.
R. aquatilis L. — Magnée, Romsée, Fléron, etc., les fossés. C.C.
Variété avec toutes les feuilles découpées ou capillaires. — Magnée, un fossé. R.R.
R. fluitans Lam. — Fond-de-Forêt, le ruisseau. Vaux-sous-Chèvremont, la Vesdre. A.C.

- R. Flammula L. — Les fossés et les prairies humides. C.C.
R. auricomus L. — Fond-de-Forêt, lieux ombragés. A.C.
 Var. à fleurs sans pétales. — Magnée, le long d'une haie. A.C.
R. acris L. — Les prairies, les haies, les bois. C.C.
R. sylvaticus Thuill. — Fraipont, les bois. A.R.
R. repens L. — Les haies, les champs, etc. C.C.
R. bulbosus L. — Le long des haies, etc. C.C.
R. Philonotis Ehrh. — Saive, champs humides. A.R.
R. arvensis L. — Les moissons. C.C.
R. sceleratus L. — Magnée et Romsée, bords des fossés et les lieux humides. A.C.
Ficaria ranunculoides Monch. — Le long des haies et les prairies. C.C.
Caltha palustris L. — Toutes les prairies humides. C.C.
Aquilegia vulgaris L. — Fraipont, lieux ombragés. A.R.
Delphinium Consolida L. — Chaudfontaine, Forêt, Olne, les moissons. C.C.
Aconitum lycoctonum L. — Lisière du bois entre Fraipont et le hameau du Troz. A.R.
Actaea spicata L. — Magnée, les haies et les bois. A.C.

BERBÉRIDÉES.

- Berberis vulgaris L. — Magnée, montagne aride appelée Hez-d'-Pèket. A.R.

CARYOPHYLLÉES.

- Dianthus prolifer L. — Forêt, pelouse aride. A.R.
D. Armeria L. — Magnée, Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, le long des chemins et lisière des bois. A.C.
Saponaria officinalis L. = Chaudfontaine, Prayon, etc., les bords de la Vesdre. C.C.
S. Vaccaria L. — Fraipont, les moissons. R.R.
Sileue inflata Sm. = Magnée, Chaudfontaine, etc., les champs. C.C.
S. anglica L. — Saint-Hadelin (Olne), les moissons. A.R.
S. nutans L. — Chaudfontaine, les rochers schisteux. C.C.
Melandrium sylvestre Rohl. — Fond-de-Forêt, Chaudfontaine, etc., bords des ruisseaux. C.C.
M. pratense Rohl. — Magnée, les moissons. Vaux-sous-Chèvremont, lieux humides. A.R.
Lychnis Flos-Cuculi L. — Toutes les prairies humides. C.C.

- L. Viscaria* L. — Prayon (Forêt), les rochers schisteux. A.C.
L. Githago Lam. — Dans toutes les moissons. C.C.
Spergularia rubra Pers. — Vaux-sous-Chèvremont, lieux arides. A.R.
S. segetalis Fenzl. — Hameau du Trimotet (Forêt), bords des champs. A.R.
Spergula arvensis L. — Magnée, etc., les champs. C.C.
Sagina procumbens L. — Magnée, les champs. A.C.
S. apetala L. — Magnée, les lieux cultivés, bords des chemins. C.C.
Holosteum umbellatum L. — Ayeneux, au pied du mur du parc du château de Wegimont. A.R.
Arenaria trinervia L. — Magnée, etc., le long des haies, etc. C.C.
A. serpyllifolia L. — Les champs et les lieux secs. C.C.
Stellaria media Sm. — Les lieux cultivés, le long des haies, etc. C.C.
S. nemorum L. — Magnée, lieux humides et ombragés. C.C.
S. Holostea L. — Les baies, etc. C.C.
S. glauca With. — Magnée, ravine humide appelée *Gargonade*. R.R.
S. graminea L. — Les haies, les bois. C.C.
S. uliginosa Murr. — Magnée, Ayeneux, les ruisseaux. A.C.
Cerastium triviale Link. — Magnée, etc., le long des haies et les lieux cultivés. C.C.
C. glomeratum Thuill. — Magnée, Chaudfontaine, etc., pelouses et lieux cultivés. C.C.
C. apetalum Dmtr. — Magnée, les lieux cultivés. A.R.
C. semidecandrum L. — Magnée, Ayeneux, Chaudfontaine, pelouses arides. C.C.
C. obscurum Chaub. — Chaudfontaine, le long d'un chemin derrière la ferme du bois. R.R.
C. tomentosum L. — Chaudfontaine, rocher calcaire du château de la Rochette, une seule touffe. Chénée, les murs. A.C.
C. arvense L. — Magnée, Chaudfontaine, bords des champs. C.C.
C. aquaticum L. — Fond-de-Forêt, bords du ruisseau. Chaudfontaine, Prayon, etc., bords de la Vesdre. C.C.

LINÉES.

- Linum catharticum* L. — Magnée, Chaudfontaine, Forêt, etc., pelouses arides. C.C.
L. usitatissimum L. — Magnée, Fléron, Forêt, les moissons. A.R.
Radiola linoides Gmel. — Chaudfontaine, pelouse aride. A.R.

OXALIDÉES.

- Oxalis Acetosella* L. — Les haies, les bois, les rochers. C.C.
O. stricta L. — Les lieux cultivés, etc. C.C.

BALSAMINÉES.

- Impatiens Noli-tangere* L. — Magnée, Fond-de-Forêt, Vaux-sous-Chèvre-mont, lieux humides et ombragés. A.C.

GÉRANIACÉES.

- Geranium columbinum* L. — Magnée, les buissons, les haies. C.C.
G. dissectum L. — Magnée, etc., les champs, etc. C.C.
G. pyrenaicum L. — Fond-de-Forêt, les haies et bords des chemins. A.C.
G. pusillum L. — Magnée, Fléron, Fond-de-Forêt, etc., bords des chemins. C.C.
G. molle L. — Fond-de-Forêt, bords des chemins. C.C.
G. Robertianum L. — Les haies, etc. C.C.
Erodium cicutarium L'Herit. — Magnée, Ayeneux, etc., bords des chemins. C.C.

MALVACÉES.

- Malva rotundifolia* L. — Bords des chemins. C.C.
M. sylvestris L. — Fond-de-Forêt et hameau du Trimotet, bords des chemins. C.C.
M. moschata L. — Magnée, Ayeneux, Romsée, le long des haies. C.C.
Althaea officinalis L. — Le 31 juillet 1863, M. Cogniaux et moi en avons trouvé un pied, à Fraipont, sur un talus qui longe une mare.
A. hirsuta L. — M. Crepin m'en a envoyé, il y a quelques années, un échantillon qu'il avait récolté à Nessonvaux.

TILIACÉES.

- Tilia pauciflora* Hayne. — Magnée. A.R.
T. vulgaris Hayne. — Magnée. A.C.
T. microphylla Vent. — Magnée et près de la station du Troz (Forêt). A.C.

POLYGALÉES.

- Polygala vulgaris* L. — Magnée, Chaudfontaine, Forêt; etc., bois, pelouses. C.C.
P. depressa Wend. — Chaudfontaine, Olne, pelouses arides et bruyères. C.C.
P. oxyptera Rchbh. — Chaudfontaine, pelouses arides. Beaufays, lisière du bois. A.C.

ACÉRINÉES.

- Acer campestre* L. — Magnée, etc., les haies. C.C.
A. Pseudo-Platanus L. — Chaudfontaine, etc., les bois. C.C.

CÉLASTRINÉES.

- Evonymus Europaeus* L. — Magnée, etc., les haies. C.C.

MONOTROPÉES.

- Monotropa Hypopitys* L. — Chaudfontaine, bois de sapin. R.R.
M. Hypophegea Wallr. — Forêt, bois, au pied d'un hêtre. R.R.

HYPÉRICINÉES.

- Hypericum humifusum* L. — Magnée, Vaux-sous-Chèvremont, les haies et lieux ombragés. A.C.
H. perforatum L. — Magnée, le long des haies et lieux arides. C.C.
H. quadrangulum L. — Magnée, bois montueux. A.C.
H. tetrapterum Fries. — Chaudfontaine, Fraipont, lieux humides. A.R.
H. pulchrum L. — Chaudfontaine, pelouses arides et lisière des bois. C.C.
H. hirsutum L. — Magnée, bois et le long des haies. A.C.
H. montanum L. — Magnée, bois montueux. R.R. Nessonvaux, montagne aride. C.C.

DROSÉRACÉES.

- Drosera rotundifolia* L. — Cette plante a été trouvée à Tilff dans une prairie marécageuse par M. C. Malaise.
Parnassia palustris L. — Saint-Hadelin (Olne), dans une prairie marécageuse appelée *les Stokeux*. C.C. Beaufays, bords des étangs de l'abbaye. A.R.

PYROLACÉES.

- Pyrola rotundifolia* L. — Forêt, bois. C.C.
P. minor L. — Forêt, bois. C.C.

RÉSÉDACÉES.

- Reseda luteola* L. — Magnée, montagne aride. Chaudfontaine, etc., bords des chemins. C.C.
R. lutea L. — Magnée, Forêt, Chaudfontaine, lieux incultes et bords des champs. C.C.

NYMPHÉACÉES.

- Nuphar luteum* Sibth. et Sm. — Herstal, les fossés de l'*île Moncin* et bords de la Meuse. A.C.
Nymphaea alba L. — Cette plante a été trouvée, par M. C. Malaise, au bord de la Meuse, entre Liège et Jupille. R.R.

PAPAVÉRACÉES.

- Papaver Rhoeas* L. — Les moissons. C.C.
P. Argemone L.* — Magnée, Forêt, Romsée, les moissons. A.C.
P. dubium L. — Forêt, les moissons. A.R.
Chelidonium majus L. — Les haies, etc. C.C.

FUMARIACÉES.

- Corydalis lutea* DC. — Chénée, Vaux-sous-Chèvremont, les murs. A.R.
C. solida Sm. — Magnée, Fond-de-Forêt, le long des haies, etc. C.C.
Var. *à fleurs blanches*. — Ayeneux, le long des haies dans le hameau appelé *Cour-de-Frêneau*.
Fumaria officinalis L. — Les champs. C.C.
F. Vaillantii Lois. — Hameau du Trimotet (Forêt), bord d'un champ. R.R.

CRUCIFÈRES.

- Cheiranthus Cheiri* L. — Vaux-sous-Chèvremont, les murs. A.C.
Barbarea vulgaris R. Br. — Ayeneux, Romsée, lieux humides. A.C.
B. intermedia Boreau. — Magnée, Vaux-sous-Chèvremont, Chaudfontaine, bords des chemins et lieux stériles. C.C.

Arabis sagittata DC. — Fond-de-Forêt, Prayon, lieux stériles. A. C.

A. hirsuta DC. — Prayon, Magnée, rochers calcaires et lieux arides. A. C.

Cette plante ainsi que la précédente ne sont considérées par Gonet (*Fl. élém. de la Fr.*) que comme deux variétés de l'*A. hirsuta* Scop. Elles ne diffèrent, en effet, l'une de l'autre qu'en ce que, dans la première, toutes les feuilles caulinaires sont embrassantes par deux oreillettes et que la nervure des siliques est peu saillante; tandis que, dans celle-ci, les feuilles caulinaires ne sont que demi-embrassantes, les supérieures presque pas auriculées, et que les siliques sont pourvues d'une nervure très-saillante. Cette dernière est vivace. Il reste à constater si la première l'est également ou si elle n'est que bisannuelle.

Cardamine pratensis L. — Les haies, les prairies, etc. C.C.

C. amara L. — Magnée, Fond-de-Forêt, etc., prairies humides et bords des ruisseaux. C.C.

C. hirsuta L. — Vaux-sous-Chèvremont, les lieux cultivés. A.R.

C. sylvatica Link. — Fond-de-Forêt, bois. A.R.

C. impatiens L. — Fond-de-Forêt, bois près de la grotte. A.C.

Nasturtium officinale R. Br. — Magnée, Ayeneux, etc. les fossés et les ruisseaux. C.C.

N. amphibium R. Br. — Jupille, Herstal, dans les oseraies au bord de la Meuse. A.C.

N. palustre DC. — Magnée, bord d'un fossé. A.C.

N. sylvestre R. Br. — Prayon (Forêt), Chaudfontaine, etc., bords de la Vesdre et des chemins. C.C.

Sisymbrium Alliaria Sc. — Les haies, etc. C.C.

S. officinale Sc. — Les lieux incultes et bords des chemins. C.C.

S. Austriacum Jacq. — Nessonvaux, terrain rocailleux au bord de la Vesdre. A.R.

Braya supina Koch. — Herstal, lieu pierreux au bord de la Meuse. R.R.

Erysimum cheiranthoides L. — Magnée, Romsée, bords des champs et des chemins. A.R.

Hesperis matronalis L. — Prayon (Forêt), lieux montueux et bords des chemins. A.R.

Diplotaxis tenuifolia DC. — Chaudfontaine, rocher et mur du château de la Rochette. A.C.

Brassica nigra Koch. — Magnée et Chaudfontaine, parfois dans les moissons. A.R.

Sinapis arvensis L. Var. α *Siliquis glabris*. . . *S. arvensis* L. . . Willd. *Spec. Plant.* — Magnée, etc., les champs. C.C.

Var. β *Siliquis hispides*. . . *S. orientalis* L. . . Willd. *Spec. plant.* Magnée, etc., les champs. A.C.

(293)

S. alba L. — Magnée, Chaudfontaine, les moissons. A.C.

Raphanus Raphanistrum L.

Var. à *fleurs blanches*. — Herstal, les champs. C.C.

Var. à *fleurs jaunes*. — Magnée, Romsée, les moissons. A.C.

Lunaria rediviva L. — Chaudfontaine, le long d'une haie. R.R.

L. biennis Moench. — On rencontre parfois cette espèce le long des haies, au Bois-de-Breux (Grivegnée) et à Retinne.

Draba verna L. — Magnée, Ayeneux, etc., pelouses arides et bords des chemins. C.C.

Thlaspi arvense L. — Magnée, Forêt, etc., les champs. A.C.

T. perfoliatum L. — Magnée, etc., lieux arides. C.C.

Capsella Bursa pastoris Moench. — Les lieux cultivés et bords des chemins. C.C.

CISTINÉES.

Helianthemum vulgare Gaertn. — Magnée, Forêt, etc., côteaux secs et rochers. C.C.

Var. à *fleurs blanchâtres*. — Magnée, pelouse aride. R.R.

VIOLARIÉES.

Viola hirta L. — Magnée, montagne boisée. C.C.

V. odorata L. — Magnée, les haies et les buissons.

V. sylvatica Fries. . . Var. à *fleurs blanches*. — Magnée, le long d'une haie. R.R.

V. canina L. — Magnée, Romsée, etc., les haies. C.C.

V. tricolor L.

Var. α *vulgaris*... Lej. et Court., *Comp. Fl. Belg.* — Chaudfontaine, les champs. A.C.

Var. ε *Arvensis* Lej. et Court., *Comp. Fl. Belg.* — Magnée, les champs. C.C.

RHAMNÉES.

Rhamnus catharticus L. — Fond-de-Forêt. R.R.

R. Frangula L. — Les bois, etc. C.C.

PAPILIONACÉES.

Sarothamnus scoparius Koch. — Les bois et terrains incultes. C.C.

Genista Anglica L. Chaudfontaine, Olne, les bruyères. C.C.

- G. pilosa* L. — Olne, Ayeneux, bruyères et terrains incultes. C.C.
G. tinctoria L. — Magnée, Forêt, pelouses et lisière des bois. A.C.
Ononis procurrens Wallr. — Magnée, Chaudfontaine, etc., bords des champs. C.C.
O. spinosa L. — Herstal, terrain rocailleux au bord de la Meuse. R.R.
Anthyllis Vulneraria L. — Magnée, coteaux secs. C.C.
Lotus corniculatus L. — Magnée, etc., les pelouses. C.C.
L. major Scop. — Magnée, etc., les haies et lieux humides. C.C.
Astragalus glycyphyllos L. — Chaudfontaine, Forêt, bois et haies. A.C.
Melilotus arvensis Wallr. — Magnée, Chaudfontaine, Forêt, bords des champs. C.C.
M. officinalis Willd. — Herstal, bord de la Meuse et île Moncin. C.C.
M. alba Lam. — Talus du chemin de fer entre la station du Troz et Fraipont. R.R.
Medicago Lupulina L. — Magnée, etc., pelouses, bords des chemins; cultivé. C.C.
M. sativa L. — Cultivé en grand.
M. denticulata Willd. — Bois-de-Breux (Grivegnée) et la Chartreuse (Liège), le long des chemins. A.R.
M. maculata Willd. — La Chartreuse (Liège), le long des chemins. A.R.
Trifolium minus Relhan. — Magnée, Chaudfontaine, les prairies et bords des chemins. C.C. . . . Cette plante varie beaucoup. Très-petite et peu rameuse dans les lieux arides, elle prend dans les prairies des dimensions considérables; ses ramifications sont très-allongées et toujours couchées. Mais il est facile de la reconnaître par les petits tubercules qui sont plus ou moins nombreux sur ses radicelles. Il reste à savoir si elle doit porter le nom de *Trifolium minus* Relhan., ou celui de *Trifolium filiforme* L.?
T. pratense L. — Les prairies, etc. C.C.
T. medium L. — Magnée, Chaudfontaine, les bois. A.C.
T. incarnatum L. — Cultivé.
T. arvense L. — Chaudfontaine, Chèvremont, etc., pelouses arides. A.C.
T. striatum L. — Romsée et Chèvremont, les pelouses. A.R.
T. procumbens L. — Forêt, Romsée, les champs. C.C.
T. repens L. — Les pelouses et bords des chemins. C.C.
T. fragiferum L. — Herstal, pelouses au bord de la Meuse. A.C.
Vicia sativa L. — Cultivé en grand.
V. sepium L. — Magnée, etc., les haies. C.C.
V. Cracca L. — Magnée, etc., les haies, les buissons, les bois. C.C.
V. tenuifolia Roth. — Forêt, Chèvremont, les bois. A.C.

- V. tetrasperma* Moench. — Magnée, Romsée, les haies. A.R.
V. hirsuta Koch. — Magnée, etc., les moissons, les haies, les buissons.
C.C.
Lathyrus Aphaca L. — Herstal, les moissons. A.C.
L. tuberosus L. — Herstal, les moissons. A.C.
L. pratensis L. — Magnée, etc., les prairies et les haies. C.C.
L. sylvestris L. — Montagnes boisées entre Chénée et Tilff, et entre
Prayon et Audoumont. A.R.
Orobis tuberosus L. — Chaudfontaine, bois. C.C.
Var. *Linifolius* Boenn. — Lisière du bois entre Chaudfontaine et
Vaux-sous-Chèvremont. R.R.
Ornithopus perpusillus L. — Fraipont, Forêt, pelouses arides. R.R.
Onobrychis sativa Lam. — Magnée, etc., quelques prairies. Cultivé.
Hippocrepis comosa. — Tilff, près de Sainval. R.

LYTHRARIÉES.

- Lythrum Salicaria* L. — Magnée, Vaux-sous-Chèvremont, Fraipont, etc.,
prairies humides et bords des ruisseaux. C.C.
Peplis Portula L. — Fléron, un fossé peu profond, dans l'endroit appelé
sur les *Chessious*. R.R.

PORTULACÉES.

- Montia fontana* L. — Ayeneux, ruisseau, dans l'endroit appelé *Riesson-*
sart. R.R.

PARONYCHIÉES.

- Herniaria glabra* L. — Chaudfontaine, terrain aride derrière le cimetière.
R.R.
Scleranthus annuus L. — Magnée, etc., les moissons et bords des che-
mins. C.C.

CRASSULACÉES.

- Sedum acre* L. — Chèvremont, lieux incultes. A.C.
S. sexangulare DC. — Fraipont, pelouse et endroit rocailleux. A.R.
S. reflexum L. — Fond-de-Forêt, Chaudfontaine, etc., les rochers. C.C.
S. rupestre L. — Fraipont, les rochers et endroits rocailleux. C.C.
S. album L. — Magnée, les lieux arides et les rochers. C.C.
S. dasyphyllum L. — Trouvé à Tilff sur un rocher, par M. Cogniaux,
professeur à l'école moyenne de Visé. A.C.

- S. telephium* L. — Magnée, Romsée, etc., bords des champs et les haies. C.C.
S. maximum Pers. — Rocher entre Nessonvaux et Pepinster. R.R.
Cette plante est trop fréquemment cultivée, pour que je puisse la considérer comme indigène.
Sempervivum Funkii A. Br. — Fléron, sur les murs. A.R.
S. tectorum L. — Magnée, sur plusieurs toits en chaume.

AMYGDALÉES.

- Cerasus avium* Moench. — Magnée, etc., les bois et les haies. C.C.
C. padus DC. — Entre Fraipont et la station du Troz. A.R.
Prunus spinosa L. — Coteaux, haies, bois. C.C.
P. insititia L. — Romsée, une haie. R.R.

ROSACÉES.

- Spiraea Ulmaria* L. — Magnée, etc., prairies humides et bords des ruisseaux. C.C.
Rubus adaeus L. — Magnée, etc., les haies et les bois. C.C.
R. caesius L. — Les haies et les buissons. C.C.
R. fruticosus L. — Haies, buissons, bois. C.C.
Geum urbanum L. — Les haies. C.C.
Fragaria vesca L. — Magnée, Forêt, Chaudfontaine, etc., le long des haies et les bois. C.C.
F. elatior Ehrh. — Saint-Hadelin (Olne), des broussailles dans l'endroit appelé *Sur-les-Hez*. R.R.
Potentilla Fragariastrum Ehrh. — Magnée, Forêt, etc., lieux arides et le long des haies. C.C.
P. Tormentilla Sibth. — Magnée, etc., les prairies, lisière des bois. C.C.
P. reptans L. — Fond-de-Forêt, Chaudfontaine, bords des chemins et le long des haies et des champs. C.C.
P. verna L. — Magnée, Fond-de-Forêt, rochers et lieux montueux et arides. C.C.
P. argentea L. — Magnée, Chèvremont, Prayon, lieux montueux et arides les rochers schisteux et calcaires. A.C.
P. Anserina L. — Magnée, etc., bords des chemins. C.C.
Rosa arvensis L.
Var. *Bibracteata* Bast. — Magnée, les haies. C.C.
Var. *Repens* Scop. — Chaudfontaine, lisière du bois. A.C.
R. stylosa Desv. — Magnée, montagne boisée appelée *Hez-d'peké*. A.C.

On ne rencontre que cette espèce dans cette localité; on n'y trouve absolument aucun pied de *Rosa arvensis*.

R. canina L.

Var. *Senticosa* Sav. — Magnée, les haies. A.C.

Var. *Dumalis* Hayn. — Forêt au hameau du Trimotet, les haies. A.C.

Var. *Biserrata* Red. — Romsée, les haies. A.R.

R. tomentosa Sm.

R. mollissima Willd. Var. α *Foliis eglandulosis* Lej. — Magnée, sur la lisière de deux petits bois montueux. Seulement trois touffes.

R. rubiginosa L. — Magnée, Forêt, Chaudfontaine, les haies et montagnes arides. A.C.

Agrimonia Eupatoria L. — Magnée, Chaudfontaine, Forêt, etc., les bois et le long des haies. C.C.

POMACÉES.

Mespilus Germanica L. — Magnée, Forêt, les haies. A.R.

Crataegus oxyacantha L. — Haies, bois. C.C.

Pyrus communis L. — Magnée, Forêt, les haies. R.R.

Malus acerba Méral. — Chaudfontaine, en allant du côté de la ferme du bois, on trouve sur le bord du chemin un arbre magnifique appartenant à cette espèce.

Sorbus aucuparia L. — Forêt, Chaudfontaine, les bois. A.R.

ONAGRARIÉES.

Epilobium spicatum Lam. — Chaudfontaine, lieu inculte. Prayou (Forêt), talus du chemin de fer près de la station du Troz. C.C.

E. hirsutum L. — Magnée, Fond-de-Forêt, lieux humides et bords des ruisseaux. C.C.

E. molle Lam. — Magnée, bords des fossés. Fond-de-Forêt, lieux humides. C.C.

E. montanum L. — Prayou (Forêt), le long des chemins. A.C.

E. palustre L. — Magnée, bords des fossés. C.C.

E. roseum Schreb. — Magnée, etc., le long des haies. C.C.

E. collinum Gmel. — Magnée, lieu inculte dans l'endroit appelé Gargonade. A.R.

E. tetragonum L. — Herstal, oseraies de l'île Moncin. R.R.

Oenothera biennis L. — Fraipont, endroit rocailleux près du chemin de fer. C.C.

CIRCEACÉES.

- Circaea Lutetiana* L. — Magnée, lieux humides et ombragés. A.C.
C. intermedia Ehrh. — Chaudfontaine, bords du ruisseau derrière le château de la Rochette. A.R.
C. alpina. Lej. et Court. *Comp. Fl. belg.* — Saint-Hadelin (Olne), lieu humide et ombragé dans l'endroit appelé *Platte-Falixhe*. R.R.

HALORAGÉES.

- Myriophyllum verticillatum* L. — Ile Moncin à Herstal, dans un fossé. A.R.
M. spicatum L. — Fraipont, fossé près du chemin de fer. A.C.

OMBELLIFÈRES.

- Astrantia major* L. — M. C. Malaise a, le premier, rencontré un pied de cette plante sur la lisière d'un bois montueux à Fraipont. J'en ai trouvé trois pieds il n'y a pas bien longtemps; cependant elle est trop fréquemment cultivée pour qu'on ne puisse pas douter de son indigénat.
Sanicula Europaea L. — Bois de Forêt et de Beaufays. C.C.
Ægopodium Podagraria L. — Magnée, Beyne-Heusay, le long des haies. C.C.
Helosciadium nodiflorum Koch. — Environs de Tilff, bords des ruisseau. A.C.
Sium latifolium L. — Herstal, oseraies de l'île Moncin. A.C.
Pimpinella magna C. Magnée, le long des haies. C.C.
P. saxifraga L. — Magnée, endroits secs et rocailleux. C.C.
OEthusa Cynapium F. — Les haies et les lieux cultivés. C.C.
Oenanthe Phellandrium Law. — Herstal, bords des fossés. C.C.
OE. fistulosa L. — Herstal, oseraies de l'île Moncin. A.R.
OE. Peucedanifolia Poll. — Herstal, lieux humides dans l'île Moncin. R.R.
Libanotis montana All. — Colouster (Tilff) et Fraipont, rochers calcaires. A.R.
Silaus pratensis Bess. — Herstal, pelouses. C.C.
Angelica sylvestris L. Magnée, Fraipont, etc., lieux humides et ombragés. C.C.
Pastinaca sativa L. — Forêt, dans un champ de trèfle. A.R.
Heracleum Sphondylium L. — Magnée, etc., les prairies et le long des haies. C.C.

(299)

- Daucus Carota* F. — Pelouses, bords des chemins. C.C.
Orlaya grandiflora Hoffm. — Magnée, Chaudfontaine, les moissons. C.C.
Caucalis daucoides L. — Magnée, Chaudfontaine, etc., les moissons. C.C.
Torilis Anthriscus Gmel. — Magnée, haies, buissons. C.C.
T. infesta Duby. — Magnée, les moissons. C.C.
Anthriscus sylvestris Hoffm. — Le long des haies. C.C.
Chaerophyllum temulum L. — Magnée, le long des haies. C.C.
Myrrhis odorata Scop. — Magnée, le long d'une haie. Cette plante est parfois cultivée. R.R.
Scandix Pecten-Veneris L. — Les moissons, etc. C.C.

HÉDÉRACÉES.

- Hedera Helix* L. — Les rochers, les murs, les arbres dans les bois. C.C.
Cornus sanguinea L. — Magnée, Fond-de-Forêt, etc., les haies et les bois. C.C.
Cornus mas L. — Les haies et les bois. C.C.

LORANTHACÉES.

- Viscum album* L. — Parasite sur les pommiers, les peupliers. C.C.

GROSSULARIÉES.

- Ribes Uva-crispa* L. Les haies, lisière des bois, les rochers. C.C.
R. rubrum L. — Fond-de-Forêt, bois. A.C.
C'est à tort que les botanistes confondent souvent cette espèce avec le groseillier rouge cultivé. Notre groseillier sauvage fleurit beaucoup plus tôt que celui-ci, ses fleurs sont plus petites et offrent plusieurs caractères distinctifs qui méritent d'être étudiés.

SAXIFRAGÉES.

- Saxifraga granulata* L. — Magnée, Forêt, etc., les prairies et le long des haies. C.C.
S. tridactylites L. — Magnée, Chaudfontaine, les vieux murs et les pelouses arides. C.C.
Chrysosplenium oppositifolium L. — Magnée, bords des ruisseaux et lieux humides. A.C.
C. alternifolium L. — Magnée, bords des ruisseaux et lieux humides. C.C.

ÉRICINÉES.

- Erica Tetralix* L. Bruyère dans le bois de Chaudfontaine, trois ou quatre pieds. R.R. Un peu plus commun dans le bois de Beaufays.
Calluna vulgaris Salisb. — Chaudfontaine. C.C.

PRIMULACÉES.

- Primula officinalis* L. — Les prairies. C.C.
P. elatior Jacq. — Les prairies, les bois. C.C.
Limosella aquatica L. — St-Hadelin (Olne), un ruisseau dans l'endroit appelé Riessousart. R.R.
Lysimachia nemorum L. — Magnée, Chaudfontaine, bois humides. A.C.
L. Nummularia L. — Magnée, etc., le long des haies et les lieux humides. C.C.
L. vulgaris L. — Fraipont, dans les osiers aux bords des mares, et au bord de l'Ourthe entre Chênée et Tilff. C.C.
J'ai trouvé à Jupille, dans les oseraies, au pied du *Lysimachia punctata* L. et à Jelivaux (Olne), le *Lysimachia ciliata* L. Mais ces plantes sont trop fréquemment cultivées pour qu'on puisse les considérer comme indigènes.
Anagallis arvensis L.
Var. α . *Vulgaris*, à fleurs rouges... Les champs et les lieux cultivés. C.C.
Var. β . *Caerulea*, à fleurs bleues.... Magnée, Chaudfontaine, les moissons. A.C.
Var. γ . *Carnea*, à fleurs couleur chair... Magnée et Olne, bords des champs. A.R.

PLANTAGINÉES.

- Pantago major* L. — Magnée, etc., bords des chemins. C.C.
P. media L. — Magnée, les prairies et bords des chemins. C.C.
P. lanceolata L. — Toutes les prairies. C.C.
P. arenaria Waldst et Kit. — Nessonvaux, endroit rocailleux au bord de la Vesdre. R.R.

ILICINÉES.

- Ilex Aquifolium* L. — Les haies et les bois. C.C.

OLÉINÉES.

Ligustrum vulgare L. — Magnée, dans quelques haies. Forêt, bois. A.R.
Fraxinus excelsior L. — Les bois et les haies. C.C.

APOCYNÉES.

Vinca minor L. — Magnée, Vaux-sous-Chèvremont, Forêt, etc., le long des haies et les endroits humides et ombragés. C.C.

ASCLÉPIADÉES.

Vincetoxicum officinale. Mœnch. — Magnée, Fond-de-Forêt, lieux incultes et rochers. C.C.

GENTIANÉES.

Menyanthes trifoliata. L. — Saint-Hadelin (Olne), prairie marécageuse dans l'endroit appelé *sur les Stokeux*. A.C.

Limnanthemum Nymphaeoides. Link. — Herstal, les fossés de l'île Moncin.

Presque tous les fossés de cette localité ayant été comblés par les déblais d'un canal, cette plante y est devenue rare, ainsi que plusieurs autres qui, il n'y a pas longtemps, y étaient très-communes.

Gentiana Cruciata. L. — Ayeneux, au-dessus de la carrière du bois Ches-siou.... 4 pieds.

Gentiana Germanica. Willd. — Magnée, Forêt, pelouses arides. A.C.

Erythraea Centaurium. — Magnée, Forêt, Chaudfontaine, les pelouses. C.C.

Erythraea pulchella. Fries. — Chaudfontaine, les champs et les pelouses. A.R.

CONVOLVULACÉES.

Convolvulus sepium. L. — Les haies. C.C.

C. arvensis. L. — Les champs. C.C.

CUSCUTACÉES.

Cuscuta major. C. Bauh. — Fléron, Chénée, le long des haies, sur l'*Urtica dioica*, les houblons, etc. A.C.

C. trifolii. Babing. — Chénée, dans un champ de trèfle.

C. Mulleri. Nob. — Chénée, dans le même champ de trèfle que la précédente.

M. F. Muller étant le premier qui ait fixé l'attention des botanistes sur cette espèce inconnue, je me suis permis de la lui dédier.

BORRAGINÉES.

- Borrago officinalis* L. — Fléron, Magnée, les lieux cultivés. C.C.
Lycopsis arvensis L. — Romsée, les moissons. R.R.
Symphytum officinale L. — Herstal et Jupille, les prairies humides. C.C.
Myosotis palustris With. — Magnée, bords des fossés. Fond-de-Forêt, prairies humides. C.C.
M. sylvatica Hoffm. — Fond-de-Forêt, lisière du bois. C.C.
M. intermedia Link. — Les champs et les haies. C.C.
M. hispida Schlecht. — Magnée, pelouses arides. A.C.
M. strigulosa Rchbh. — Magnée, les prairies. D.C.
Pulmonaria angustifolia L. — Chaudfontaine, bords des ruisseaux. Jeli-vaux (Olne), le long des haies A.C.
Lithospermum arvense L. — Les champs. C.C.
L. officinale L. — Magnée, lieu pierrieux. Chaudfontaine, le long d'une haie. A.C.
Echium vulgare L. — Magnée, lieux arides, etc. C.C.
Cynoglossum officinale L. — Magnée, le long des haies. C.C.

SOLANÉES.

- Solanum Dulcamara* L. — Fond-de-Forêt et Prayou, etc., les buissons et bords de la Vesdre. C. C.
S. nigrum L. — Fond-dè-Forêt, Vaux-sous-Chèvremont, etc., lieux cultivés et bords des chemins. A.C.
Physalis Alkekengi L. — Chaudfontaine, près du château de la Rochette R.R. Prayou (Forêt), le long d'une haie sur la montagne derrière l'usine de la Nouvelle Montagne. C.C.
Atropa Belladonna L. — Chaudfontaine, derrière le château de la Rochette. A.R.
Lycium Barbarum L. — Chénée, le talus du chemin de fer. R.R.
Datura Stramonium L. — Prayou (Forêt), terrain inculte. R.R.

VERBASCÉES.

- Verbascum Tapsus* L. — Magnée, Chaudfontaine etc., lieux incultes et bords des chemins. C.C.
V. tapsiforme Schrad. — Magnée, Chaudfontaine, Prayou, etc., lieux incultes. C.C.

- V. phlomoides L. — Forêt, bord d'un chemin dans le bois. Je n'en ai trouvé qu'un seul pied. R.R.
- V. nigrum L. — Tous les environs, bords des chemins et lieux arides. C.C.
- V. Lychnitis L.
- Var. à fleurs blanchâtres... Magnée et hameau du Trimotet, lieux arides. C.C.
- Var. à fleurs d'un jaune foncé... Les bords du chemin entre Fraipont et la station du Troz. A.R.
- V. Blattaria L. — Chaudfontaine, près de la ferme du bois, le long d'un mur et d'une haie. A.R.

SCROPHULARINÉES.

- Veronica hederifolia L. — Les champs. C.C.
- V. agrestis L. — Magnée, etc., les champs et lieux cultivés. C.C.
- V. polita Fries. — Chaudfontaine, Saint-Hadelin (Olne), Forêt, les champs. A.R.
- V. triphyllos L. — Entre Jupille et la paroisse du Bois-de-Brex, les moissons. A.C.
- V. arvensis L. — Magnée, etc., les champs et lieux cultivés. C.C.
- V. serpyllifolia L. — Magnée, etc., lieux cultivés et bords des chemins. C.C.
- V. officinalis. — Magnée, le long des haies; Chaudfontaine, bois. C.C.
- V. montana L. — Magnée, le long des haies. Forêt, lisière du bois. C.C.
- V. scutellata L. — Magnée, les fossés, A.C. et Fond-de-Forêt, lieux humides. A.R.
- V. Anagallis L. — Herstal et entre Chénée et Colonster, les fossés. A.R.
- V. Beccabunga L. — Magnée, etc., les fossés et lieux humides. C.C.
- V. Chamaedrys L. — Magnée, etc., les haies. C.C.
- Scrophularia nodosa L. — Magnée, Chaudfontaine, etc., les haies. C.C.
- S. aquatica L. — Magnée, bord d'un fossé. Fond-de-Forêt, bords du ruisseau, etc. C.C.
- Digitalis purpurea L. — Fléron, Magnée, Chaudfontaine, etc., endroits ombragés et lisière des bois. C.C.
- Antirrhinum Orontium L. — Magnée, etc., les champs. C.C.
- Linaria vulgaris Moench. — Bords des chemins et des champs, lieux incultes et les haies. C.C.
- L. minor Desf. — Dans tous les champs. C.C.
- L. elatine Desf. — Magnée, Chaudfontaine, etc., les champs. C.C.
- L. Cymbalaria Mill. — Vaux-sous-Chèvremont, muraille au bord de la Vesdre, et Herstal, mur au bord de la Meuse. C.C.
- Pedicularis sylvatica L. — Chaudfontaine et Olne, etc., bruyères et pelouses. C.C.

- P. palustris* L. — Tilff, prairies marécageuses. R.R.
Rhinanthus major. — Prairie entre Prayon et le hameau du Thier. A. R.
R. minor Ehrh. — Magnée, etc., les prairies humides. C.C.
Euphrasia Odontites L. — Chaudfontaine, lieux incultes. A.C.
E. officinalis L.
 Var. α *parviflora* Lej.
 Var. β *grandiflora* Lej. Magnée, les prairies. C.C.
Melampyrum pratense L. — Magnée, Chaudfontaine, etc., les bois. C.C.
M. arvense L. — Forêt, etc., les moissons. A.C.

OROBANCHÉES.

- Orobanche Rapum* Thuill. — Nessonvaux, sur le *Sarothamnus scoparius*. R.R.
O. minor Sutt. — Magnée, Forêt, Olne, etc., dans les champs de trèfle. C.C.

LABIÉES.

- Me proposant de faire paraître dans quelque temps une monographie des menthes qui croissent dans les environs de Liège, je les omets dans ce catalogue.
Melittis melissophyllum L. — Trouvé à Tilff. Je ne l'y ai plus retrouvé.
Lycopus Europaeus L. — Magnée et Romsée, bords des fossés. A.C.
Origanum vulgare L. — Magnée, Fonds-de-Forêt, etc., le long des haies. C.C.
Thymus Serpyllum L. — Partout sur les pelouses arides. C.C.
 Var. *Thym. inodorus* Lej. Revue. — Chaudfontaine, bord d'un champ. R.R.
Calamintha Acinos Gand. — Magnée, etc., lieux arides et pierreux. C.C.
Chenopodium vulgare L. — Magnée, Fond-de-Forêt, etc., les haies, etc. C.C.
Melissa officinalis L. — Fond-de-Forêt et Saint-Hadelin (Olne), le long des haies. C.C.
Nepeta Cataria L. — Fléron, le long d'une haie. R.R.
Glechoma hederacea L. — Le long des haies. C.C.
Lamium amplexicaule L. — Les champs. C.C.
L. purpureum L. — Les lieux cultivés, les champs, etc. C.C.
L. album L. — Les haies. C.C.
L. hirsutum Lej. Lam. Rubrum. Wallroth. — Fond-de-Forêt, le long des ruisseaux. A.C.

- L. maculatum* L. — Fraipont... trouvé un seul pied, près du cimetière.
Galeobdolon luteum Huds. Magnée, etc., les haies et lisière des bois. C.C.
Galeopsis versicolor Curtis. — Magnée, dans un champ de pommes de terre. R.R.
G. ochroleuca Lam. — Prayou (Forêt), Chaudfontaine, lieux pierreux, les moissons, les rochers schisteux. C.C.
G. Ladanum L.
 Var. α . *Angustifolia* Lej. — Magnée, lieux pierreux et arides. C.C.
 Var. *b...* *grandiflora* Lej. Magnée et hameau du Trimotet, les champs. A.R.
 Var. γ ... *Latifolia* Nob. — Magnée, lieux cultivés. A.R.
G. intermedia Vill. — Magnée, lieu cultivé sur les *Hez d'Pèket*. R.R.
G. Tetrahit L. — Lieux cultivés, les bois, etc. C.C.
Stachys sylvatica L. — Bois, buissons, haies. C.C.
S. alpina L. — Fond-de-Forêt (au bai Bonnet), terrain aride, le long d'une haie. A. R.
S. palustris L. — Fraipont, bord des mares. Magnée, les moissons, etc. C.C.
S. arvensis L. — Les champs. C.C.
S. annua L. — Magnée, lieu cultivé sur les *Hez d'Pèket*. A.R.
Betonica officinalis L. — Les bois, le long des haies, etc. C.C.
Marrubium vulgare L. — Jupille, bord d'un chemin. R.R. Chênée, lieu inculte. R.R.
Ballota foetida Lam. — Romsée, Fléron, Prayou, le long des haies. A.C.
Leonurus Cardiaca L. — Chèvremont, Prayou (Forêt), le long des haies A.R.
Brunella vulgaris L. — Le long des haies, les prairies, etc. C.C.
Scutellaria galericulata L. — Fraipont, lieux humides. A.C.
S. minor L. — Ayeneux, lieu humide et ombragé. A.R.
S. hybrida Nob. — Olne-Saint-Hadelin, prairie marécageuse appelée *sur les Stokeux*. R.R.
-

Scutellaria.

A. Calice glabrescent.

Scutellaria galericulata L. — Tige ordinaire dressée, rameuse, pubescente sur les angles, *poils couchés de haut en bas*. Feuilles oblongues-an céolées, toutes cordées, *crénelées*, à nervures couvertes de *poils*

recourbés de haut en bas, glabres sur la face supérieure. Pédoncule glabrescent, moitié plus court que le calice. *Corolle grande*, à tube genouillé à lèvre inférieure entière ou presque entière; lèvre supérieure à trois lobes, celui du milieu large, *voûté*, entier ou presque entier, les deux latéraux infléchis par leur base dans celui du milieu et à bords roulés en dehors. Fleurs d'un bleu violacé, solitaires à l'aisselle des feuilles.

B. *Calice velu*.

α Scutellaria minor. L... Tige dressée, peu rameuse, pubescente sur les angles, *à poils couchés de bas en haut*. Feuilles un peu velues sur les deux faces, surtout sur la nervure médiane, *à poils étalés à pointe recourbée de bas en haut*; les inférieures ovales-cordées, *munies de deux dents à la base*, les supérieures lancéolées, entières et rétrécies en pétioles. *Pédoncule velu et plus long que le calice*. Corolle petite, à tube genouillé, *à lèvre inférieure comme à trois lobes*. Lèvre supérieure à trois lobes, celui du milieu étroit, redressé, non voûté, échancré au sommet, les deux latéraux à limbe étalé. Fleurs d'un rose pâle, unilatérales, solitaires à l'aisselle des feuilles, à lèvre inférieure ponctuée de pourpre.

β Scutellaria hybrida Nob.... Tige couchée-redressée, rameuse, pubescente sur les angles, *à poils couchés de bas en haut*. Feuilles un peu velues sur les deux faces, surtout sur la nervure médiane, *à poils étalés, à pointe recourbée de bas en haut*, oblongues-lancéolées, *toutes cordées à la base et dentées presque jusqu'au sommet*. Pédoncule velu, aussi long que le calice. Corolle petite, à tube genouillé, à lèvre inférieure à trois lobes, celui du milieu échancré; lèvre supérieure à trois lobes, celui du milieu voûté, échancré et à bords redressés; les latéraux infléchis par leur base dans celui du milieu et à bords roulés en dehors. Fleurs d'un violet pâle, à lèvre inférieure ponctuée d'un violet plus foncé.

Ajuga reptans L. — Les bois, les haies, les prairies. C.C.

Teucrium Scorodonia L. — Les bois, les lieux arides, les haies. C.C.

T. Botrys L. — Magnée, lieux pierreux. A.C.

VERBÉNACÉES.

Verbena officinalis L. — Fond-de-Forêt, Chaudfontaine, etc., bords des chemins. C.C.

VACCINIÉES.

Vaccinium Myrtillus L. — Chaudfontaine, etc., les bois. C.C.

CAMPANULACÉES.

- Campanula glomerata* L. — Le long d'une haie entre le hameau du Troz (Forêt) et les Forges. R.R.
- C. rotundifolia* L. — Magnée, Chaudfontaine, etc., les prairies, les rochers, etc. C.C.
- C. pusilla* Hœnk. — Le long d'une haie entre Olne et Nessonvaux. R.R.
- C. rapunculoïdes* L. — Chênée, les champs. A.C.
- C. Trachelium* L. — Magnée, etc., bois, haies. C.C.
- C. Rapunculus* L. — Haies, prairies C.C.
- C. persicaefolia* L. — Magnée, etc., bois et haies. C.C.
- Specularia speculum* Alph. D.C. — Les moissons. C.C.
- Phyteuma spicatum* L. (Bellynck, *Fl. nam.*). — Bois entre le hameau du Troz et Fraipont. C.C.
- P. nigrum* Schmidt (Bellynck, *Fl. nam.*). — Magnée, etc., les lieux ombragés. C.C.
- Jasione montana* L. — Chaudfontaine, Chèvremont, etc., les lieux arides C.C.

CUCURBITACÉES.

- Bryonia dioica* Jacq. — Toutes les haies. C.C.

CAPRIFOLIACÉES.

- Adoxa moschatellina* L. — Magnée, etc., le long des haies. C.C.
- Sambucus nigra* L. — Les haies. C.C.
- S. racemosa* L. Magnée, Vaux-sous-Chèvremont, entre le hameau du Troz et Fraipont, bois montueux. A.C.
- S. Ebulus* L. — Fléron et Fond-de-Forêt, bords des chemins. A.C.
- Viburnum opulus* L. — Magnée, Forêt, etc., les haies et les bois. C.C.
- Lonicera Xylosteum* L. — Forêt, lisière du bois. R.R.
- L. Periclymenum* L. — Les haies et les bois. C.C.

RUBIACÉES.

- Sherardia arvensis* L. — Les champs et les lieux cultivés. C.C.
- Var. à fleurs blanches. — Chaudfontaine, les champs. A.R.
- Asperula odorata* L. — St-Hadelin (Olne) endroit appelé Platte-Falixhe et Tilff, bois montueux. A.R.
- Galium cruciata* Scop. — Haies et buissons. C.C.

(308)

- G. verum* L. — Magnée, etc., bords des chemins et lieux arides. C.C.
G. sylvaticum L. — Tilff et chemin dans le bois entre le hameau du Troz et Jelivaux. A.C.
G. sylvestre Poll. — Pelouses, le long des haies et lisière des bois. C.C.
G. Mollugo L. — Haies, buissons, bois, prairies. C.C.
G. palustre L. — Magnée, Chaudfontaine, etc., bords des fossés. C.C.
G. Aparine L. — Les haies et les buissons. C.C.

VALÉRIANÉES.

- Valeriana officinalis* L. — Chaudfontaine, Fond-de-Forêt, Magnée, les bois et les haies. C.C.
V. dioica L. — St-Hadelin (Olne), endroit appelé Sur les Stoken, Tilff, prairies marécageuses. A.C.
Valerianella olitoria Moench. — Les moissons et les lieux cultivés. C.C.
V. auricula D.C. — Les moissons. C.C.
V. Morisonii D.C. — Les moissons. A.R.

DIPSACÉES.

- Scabiosa Succisa* L. — Chaudfontaine, Magnée, etc., bois et prairies. C.C.
S. Columbaria L. — Magnée, etc., pelouses, rochers, etc. C.C.
Knautia arvensis Coult. — Magnée, etc., les prairies, etc. C.C.
Dipsacus sylvestris L. — Chaudfontaine, Fraipont, lieux incultes. A.R.

COMPOSÉES.

- Carlina vulgaris* L. — Coteaux secs, bords des chemins. C.C.
Cirsium lanceolatum Scop. — Magnée, etc., le long des haies. C.C.
C. acaule All. — Pelouses arides et bords des chemins. C.C.
C. arvense Scop. — Les champs et bords des chemins. C.C.
Carduus crispus L. — Lieux incultes, bords des chemins. C.C.
C. nutans L. — Magnée, Forêt, etc., bords des chemins. C.C.
Lappa minor D.C. — Le long des haies. C.C.
L. major Gaertn. — Forêt, lisière du bois. R.R.
Centaurea montana L. — Chaudfontaine, bois qui longe la Vesdre. A.C.
C. Cyanus L. — Les moissons. C.C.
C. scabiosa L. — Jelivaux (Olne), terrain inculte. A.R.
C. Calcitrapa L. — Herstal, endroits rocailleux. R.R.
Bidens tripartita L. — Magnée, bords des fossés. C.C.
B. cernua L. — Magnée, Hausez (Olne), bords des fossés. A.R.

- Achillea Millefolium* L. — Magnée, etc., les lieux arides, les rochers, les murs. C.C.
- A. Ptarmica* L. — Magnée, etc., les prairies marécageuses. C.C.
- Anthemis Cotula* L. — Romsée, les moissons. R.R.
- A. arvensis* L. Magnée, Romsée, etc., les moissons. C.C.
- Pyrethrum Leucanthemum* Coss. et Germ. — Magnée, Fléron, Romsée, etc., les prairies. C.C.
- P. Parthenium* Sm. — Magnée, Romsée, Chaudfontaine, le long des haies et bords des chemins. A.C.
- Chrysanthemum segetum* L. — Les champs. C.C.
- Bellis perennis* L. — Les prés. C.C.
- Artemisia Absinthium* L. — Chaudfontaine, rocher et bords des chemins près du château de la Rochette. A.C.
- A. vulgaris* L. — Vaux-sous-Chèvremont, Prayou. C.C.
- Tanacetum vulgare* L. — Les haies, bords des chemins. C.C. dans tous ces environs.
- Gnaphalium uliginosum* L. — Magnée et tous les environs, lieux cultivés, bords des chemins, etc. C.C.
- G. sylvaticum* L. — Magnée, Chaudfontaine, Forêt, etc., les haies, lisière des bois, lieux incultes. A.R.
- Antennaria dioica* Gaertn. — Chaudfontaine et Olne, bruyères. C.C.
- Filago Germanica* L. — Magnée, etc., lieux incultes et bords des chemins. C.C.
- Filago minima* Fries. — Chaudfontaine, lieux arides. C.C.
- Pulicaria dysenterica* Gaertn. — Jupille et Herstal, oseraies, A.C.
- P. vulgaris* Gaertn. — Herstal, bords des fossés. A.C.
- Inula Britannica* L. — Jupille, bords de la Meuse, le long de la route A C.
- I. Helenium* L. — Magnée, le long d'une haie dans une prairie; probablement échappée d'un jardin. Cette plante est cultivée dans beaucoup de jardins des environs.
- I. salicina* L. — Je n'en ai jamais trouvé qu'un seul pied à Vaux-sous-Chèvremont.
- I. Conyza* D.C. — Magnée, etc., les haies et bords des chemins. C.C.
- Solidago Virga aurea* L. — Chaudfontaine, bois montueux. C.C.
- Erigeron acris* L. — Magnée, etc., pelouses, lieux arides, les murs. C.C.
- E. canadensis* L. — Chénée, lieux rocailleux, au bord de la Vesdre. A.R.
- Senecio vulgaris* L. — Les lieux cultivés. C.C.
- S. sylvaticus* L. — Forêt, bois montueux. R.R.
- S. viscosus* L. Magnée, Chaudfontaine, etc., bords des chemins, lieux pierreux. C.C.

- S. Jacobaea* L. — Prairies et bords des chemins. C.C.
S. Saracenicus L. — Chaudfontaine, les bois. A.C.
S. aquaticus Huds. — Jupille et Herstal, les oseraies. A.C.
Eupatorium cannabinum L. — Magnée, Fond-de-Forêt, les lieux humides. C.C.
Tussilago Farfara L. — Les champs. C.C.
Petasites vulgaris Desf. — Fond-de-Forêt, Chaudfontaine, etc., bords des ruisseaux. C.C.
Lapsana communis L. — Les lieux cultivés, les haies. C.C.
Cichorium Intybus L. — Bords des chemins et des champs, lieux incultes. C.C.
Hypochoeris radicata L. — Toutes les prairies. C.C.
Thrinicia hirta Roth. — Magnée, Forêt, etc., pelouses arides. C.C.
Leontodon autumnalis L. — Magnée, Vaux-sous-Chèvremont, etc., les prairies et bords des chemins. C.C.
L. hispidus L. — Vaux-sous-Chèvremont, les bois. A.R.
Pieris hieracioides L. — Magnée, Prayou (Forêt), bords des chemins et côteaux pierreux. C.C.
Tragopogon pratensis L. — Magnée, les prairies. A.C.
Taraxacum officinale Wigg. — Les prairies et lieux cultivés.
Lactuca muralis Fries. — Magnée, etc., lieux ombragés, les haies, etc. C.C.
Sonchus oleraceus L. — Les lieux cultivés. C.C.
S. asper Vill. — Les lieux cultivés. C.C.
S. arvensis L. — Les moissons et lieux cultivés. C.C.
Barkhausia foetida D.C. — Magnée, etc., côteaux secs et bords des chemins. C.C.
Crepis virens L. — Magnée, les prairies. C.C.
C. biennis L. — Magnée, les champs, les haies. C.C.
C. paludosa Moench. — Magnée, prairies marécageuses et bords des ruisseaux. A.R.
Hieracium pilosella L. — Magnée, etc., pelouses et bords des chemins. C.C.
H. Auricula L. — Magnée, Chaudfontaine, le long des haies et lisière des bois. A.R.
H. murorum L. — Magnée, etc., le long des haies et bords des chemins. C.C.
Hieracium sylvaticum Lam. — Magnée, bord d'un chemin. A.R.
H. tridentatum Fries. — Chaudfontaine, les bois. A.R.
H. umbellatum L. — Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, etc., bois et lieux arides. C.C.

AMARANTACÉES.

Amarantus Blitum L. — Fond-de-Forêt et Vaux-sous-Chèvremont, les lieux cultivés. A.C.

CHÉNOPODÉES.

Atriplex hortensis L. — Fléron, les lieux cultivés. A.C.

Var. *viridis*, *A. Microsperma* W. et Kit. — Fond-de-Forêt, lieux cultivés. A.R.

A. hastata L. — Magnée, etc., les lieux cultivés et le long des haies. C.C.

A. angustifolia Sm. — Magnée, etc., les lieux cultivés et bords des chemins. A.C.

Chenopodium polyspermum L. — Les lieux cultivés. C.C.

C. Vulvaria L. — Jupille, Bois-de-Breux, bords des chemins. A.C.

C. album L. — Les lieux cultivés, bords des chemins. C.C.

C. hybridum L. — Fond-de-Forêt, bords des chemins. A.R.

Blitum Bonus-Henricus Rehb. — Les haies et bords des chemins. C.C.

B. virgatum L. — Vaux-sous-Chèvremont, le long d'une haie. R.R.

POLYGONÉES.

Rumex scutatus L. — Herstal, mur et chemin au bord de la Meuse. C.C.

R. acetosa L. — Magnée, les prairies. C.C.

R. acetosella L. — Magnée, etc., le long des haies et lieux arides. C.C.

R. obtusifolius L. — Magnée, prairies, le long des haies. A.R.

R. crispus L. — Magnée, etc., les prairies et bords des chemins. C.C.

R. hydrolapathum Huds. — Herstal, les oseraies. A.R.

Polygonum Bistorta L. — Magnée, les prairies humides. C.C.

P. amphibium L. — Chaudfontaine, bords de la Vesdre. A.R.

P. lapathifolium L. — Magnée, les lieux cultivés et humides. C.C.

P. Persicaria L. — Les lieux cultivés, etc. C.C.

P. nodosum Pers. — Herstal, les chemins au bord de la Meuse. A.C.

P. aviculare L. — Les champs, etc. C.C.

P. Hydropiper L. — Les fossés et lieux humides. C.C.

P. Convolvulus L. — Magnée, etc., les moissons, lieux cultivés. C.C.

P. dumetorum L. — Vaux-sous-Chèvremont, Chênée, les haies. A.C.

P. Fagopyrum L. — Magnée, Forêt, parfois dans les moissons. A.R.

CANNABINÉES.

Humulus Lupulus L. — Magnée, etc., les haies. C.C.

ULMACÉES.

Ulmus campestris L. — Chaudfontaine. C.C.

U. effusa Willd. — Forêt. A.C.

URTICÉES.

Urtica urens L. — Magnée, les haies. A.R... Jupille, le long des murs. C.C.

U. dioica L. — Magnée, les haies. C.C.

SANGUISORBÉES.

Alchemilla vulgaris L.

Var. α . *Pubescens*. Tin., *Fl. Luxemb.*

Var. β . *Glabra*. Tin., *Fl. Luxemb.* — Magnée, etc., les prairies et le long des haies. C.C.

A. arvensis Scop. — Les champs, etc. C.C.

Poterium Sanguisorba L. — Magnée, les prairies, bords des chemins. C.C.

P. polygamum W. et Kit. — Forêt, lisière du bois. A.R.

DAPHNOIDÉES.

Daphne Mezereum L. — Magnée, Forêt, Chaudfontaine, les bois et lieux ombragés C.C.

HIPPURIDÉES.

Hippuris vulgaris L. — Herstal, bords des fossés. R.R.

ARISTOLOCHIÉES.

Asarum Europaeum L. — Magnée, bois. C.C.

EUPHORBIACÉES.

Euphorbia Helioscopia L. — Lieux cultivés et moissons. C.C.

- Euphorbia platyphyllos* L. — Entre le hameau de la Brouke (Forêt) et Beaufays, lieu cultivé. R.R.
E. Cyparissias L. — Nessonvaux, pelouse aride. C.C.
E. Esula L.
 Var. *mosana*. Lej. — Herstal, bord de la Meuse, C.C.
E. exigua L. — Magnée, etc., les champs. C.C.
E. Peplus L. — Lieux cultivés. C.C.
E. amygdaloides L. — Chaudfontaine, etc., bois et bords des chemins, C.C.
E. lathyris L. — Prayon, lieux cultivés. R.R.
Mercurialis annua L. — Les lieux cultivés. C.C.
M. perennis L. — Magnée, etc., bois montueux et les haies. C.C.

CALLITRICHINÉES.

- Callitriche stagnalis* Scop. — Fond-de-Forêt, le ruisseau. A.C.
C. verna Kütz. — Magnée, les fossés. A.C.
C. hamulata Kütz. — Chaudfontaine, mare. A.R.

CÉRATOPHYLLÉES.

- Ceratophyllum demersum* L. — Fraipont, Herstal, les fossés et les mares. A.C.

CUPULIFÈRES.

- Fagus sylvatica* L. — Partout. C.C.
Quercus pedunculata Ehrh. — Chaudfontaine. C.C.
Q. sessiliflora Sm. — Chaudfontaine, Forêt. C.C.
Corylus Avellana L. — Les haies et les bois. C.C.
Carpinus betulus L. — Haies et bois.

SALICINÉES.

- Salix alba* L. — Magnée, Chaudfontaine, etc, les haies. A.C.
S. fragilis L. — Magnée, Ayeneux, les haies. C.C.
S. amygdalina L. — Entre Fraipont et le hameau du Troz. R.R.
S. purpurea L. — Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, bords de la Vesdre. C.C.
S. viminalis L. — Jupille, Herstal, oseraies. C.C.
S. cinerea L. — Magnée, endroit humide. R.R.
S. aurita L. — Chaudfontaine, le long du ruisseau et lieux arides. C.C.

- Salix caprea* L. — Magnée, Forêt, etc., les bois. C.C.
Populus tremula L. — Vaux-sous-Chèvremont, les bois. A.C.
P. alba L. — Forêt, les bois. A.C.
P. pyramidalis Rozier. — Magnée, etc. A.C.
P. nigra L. — Magnée, le long des chemins. C.C.

BÉTULINÉES.

- Betula pubescens* Ehrh. — Chaudfontaine, bois. A.R.
B. alba L. — Les bois. C.C.
Alnus glutinosa Gaertn. — Les bois humides et bords des ruisseaux. C.C.

ABIÉTINÉES.

- Pinus sylvestris* L. — C.C.
P. Abies L. — C.C.
P. Larix L. — C.C.

CUPRESSINÉES.

- Juniperus communis* L. — Magnée, montagne aride. C.C.

ALISMACÉES.

- Alisma Plantago* L. — Magnée, etc., les fossés. C.C.
Sagittaria sagittifolia L. — Herstal, les fossés. A.C.

BUTOMÉES.

- Butomus umbellatus* L. — Herstal, les fossés. A.C.

COLCHICACÉES.

- Colchicum autumnale* L. — Toutes les prairies. C.C.

LILIACÉES.

- Ornithogalum umbellatum* L. — Entre Jupille et Liège. R R. Cette plante a été remarquée dans cette localité par M. Malaise.
Gagea lutea Schult. — Fond-de-Forêt, pelouse sur la lisière du bois; autrefois. C.C.
Allium ursinum L. — Chaudfontaine, Fond-de-Forêt, etc., bois ombragés. C.C.

- Allium oleraceum* L. — Prayou (Forêt), montagne aride; Magnée, bords des champs. C.C.
A. vineale L. — Avec le précédent. C.C.

ASPARAGINÉES.

- Convallaria maialis* L. — Magnée, bois sur les Hez d'Pèket. A.C.
Polygonatum multiflorum All. — Magnée, etc., les haies et les bois. C.C.
P. vulgare Desf. — Colonster (Tilff.), les rochers. A.R.
Maianthemum bifolium D.C. — Beaufays, les bois. A.R.
Paris quadrifolia L. — Magnée, les bois. C.C.

IRIDÉES.

- Iris Pseudo-Acorus* L. — Ayeneux, prairies marécageuses et ruisseaux. A.C.

AMARYLLIDÉES.

- Narcissus Pseudo-Narcissus* L. — Saint-Hadelin (Olne), C.C. Fond-de-Forêt, les prairies. A.R.
N. poeticus L. — Fond-de-Forêt, Saint-Hadelin, les prairies. A.R.

ORCHIDÉES.

- Orchis coriophora* L. — Magnée, Tilff, les prairies. A.R.
O. Morio L. — Magnée, Saint-Hadelin, les prairies. C.C.
O. mascula L. — Magnée, Fond-de-Forêt, etc., prairies et bois montueux. C.C.
O. maculata L. — Magnée, Chaudfontaine, Forêt, etc., les prairies et les bois. C.C.
O. latifolia L. — Magnée, etc., les prairies humides. C.C.
Ophrys myodes Jacq. — Bois-de-Forêt. R.R.
O. apifera Huds. — Magnée, bois Chessiou. R.R.
Gymnadenia conopsea Rich. — Saint-Hadelin (sur les Stoken) et Tilff, prairies marécageuses. A.C.
Gymnadenia viridis Rich. — Magnée, Tilff, les prairies. A.C.
Platanthera bifolia Rich. — Chaudfontaine, bruyère. A.R.
P. chlorantha Cust. — Forêt, bois. C.C.
Cephalanthera pallens Rich. — Magnée, montagne boisée; Forêt, les bois. C.C.
Epipactis latifolia All. — Forêt, Nessonvaux, les bois. A.C.

(316)

- Neottia ovata* Rich. — Forêt, Magnée, etc., les bois et les prairies montagneuses. C.C.
N. Nidus avis Rich. — Forêt, bois. R.R.
Spiranthes autumnalis Rich. — Forêt, au hameau du Trimolet; Chaudfontaine, pelouses arides. C.C.

POTAMÉES.

- Potamogeton natans* L. — Fraipont, fossés. A.C.
P. rufescens Schrad. — Hansez (Olne), un fossé. R.R.
P. densus L. — Nessonvaux, le ruisseau. C.C.
P. perfoliatus. — Entre Chênée et Tilff, l'Ourte. A.C.
P. crispus L. — Entre le hameau du Troz et Audoumont, un fossé. C.C.
P. pusillus L. — Magnée, Fraipont, Herstal, les fossés. C.C.
Zanichellia palustris L. — Herstal, les fossés. A.C.

LEMNACÉES.

- Lemna minor* L. — Magnée, etc., les fossés. C.C.
L. trisulca L. — Fraipont, un fossé. C.C.
L. polyrrhiza L. — Fraipont, un fossé. A.R.

AROIDÉES.

- Arum maculatum* L. — Magnée, etc., les haies. C.C.
Acorus Calamus L. — Herstal, les fossés. A.C.

TYPHACÉES.

- Typha latifolia* L. — Ayeneux, Fraipont, Chaudfontaine, les fossés. C.C.
Sparganium ramosum Huds. — Fraipont, mares. C.C.
S. simplex Huds. — Hansez (Olne), un fossé. A.R.

JONCÉES.

- Juncus conglomeratus* L. — Magnée, Chaudfontaine, etc., bords des fossés et lieux humides. C.C.
J. effusus L. — Les mêmes localités et les mêmes stations que le précédent. C.C.
J. glaucus Ehrh. — Magnée, bords des fossés; Fléron, Chaudfontaine, pelouses humides. C.C.
J. supinus Moench. — Saint-Hadelin, prairie marécageuse sur les Stoken et ruisseau à Riessonsard. A.R.

- J. sylvaticus* Reichbh. — Magnée, lieux humides, A.C.
J. lampocarpus Ehrh. — Saint-Hadelin, une prairie marécageuse. R.R.
J. bulbosus L. — Magnée, etc., les lieux humides. C.C.
J. bufonius L. — Magnée, etc., les lieux humides. C.C.
Luzula vernalis L. — Magnée, etc., les pelouses. C.C.
L. albida DC. — Chaudfontaine, les bois. C.C.
L. maxima DC. — Chaudfontaine, les bois. C.C.
L. campestris DC. — Magnée, etc., les pelouses. C.C.

CYPÉRACÉES.

- Carex vulpina* L. — Romsée, lieux humides. C.C.
C. muricata L. — Magnée, Forêt, Chaudfontaine, etc., le long des haies C.C.
C. leporina L. — Magnée, les prairies humides. A.C.
C. remota L. — Magnée, bord d'un fossé, le long d'une haie. A.R.
C. coespitosa L. — Magnée, prairies humides. A.C.
C. acuta L. — Herstal, bords des fossés. A.R.
C. praecox Jacq. — Magnée, Romsée, Chaudfontaine, etc., les pelouses C.C.
C. digitata L. — Chaudfontaine, Prayou (Forêt), les bois. C.C.
C. glauca Scop. — Magnée, les bois et le long des haies. C.C.
C. maxima Scop. — Chaudfontaine, Vaux-sous-Chrèvremon, bords des ruisseaux. A.C.
C. panicea L. — Saint-Hadelin, prairie marécageuse *sur les Stokeux*. R.R.
C. Oederi Ehrh. — Saint-Hadelin, prairie marécageuse *sur les Stokeux*. A.R.
C. sylvatica Huds. — Les bois et lieux ombragés. C.C.
C. ampullacea Good. — Ayeneux, bord d'un fossé. R.R.
C. vesicaria L. — Fraipont, bords des fossés et des mares. C.C.
C. hirta L. — Magnée, bords des fossés et lieux humides. C.C.
Heleocharis palustris R.Br. — Magnée, etc., bords des fossés et lieux humides. C.C.
H. acicularis R.Br. — Saint-Hadelin, prairie marécageuse. R.R.
Scirpus setaceus L. — Saint-Hadelin, prairie marécageuse. R.R.
S. lacustris L. — Herstal, dans la Meuse. C.C.
S. sylvaticus L. — Herstal, bords des fossés; Magnée, prairies humides. A.C.
Eriophorum angustifolium Roth. — Magnée, prairies humides. C.C.
E. latifolium Hoppe. — Magnée, etc., prairies humides. C.C.

GRAMINÉES.

- Anthoxanthum odoratum* L. — Très-commun dans toutes les prairies.
- Phalaris arundinacea* L. — Ayeneux, Fraipont, Fond-de-Forêt, bords des mares et des ruisseaux. C.C.
- Oplismenus crus-galli* Kunth. — Herstal, gravier au bord de la Meuse. A.C.
- Digitaria filiformis* Koel. — Magnée, Chaudfontaine, les champs après la moisson. C.C.
- Setaria viridis* P.B. — Magnée, les champs après la moisson. C.C.
- S. rubicunda* Dmrt. — Magnée, les champs après la moisson. A.R.
- S. glauca* P.R. — Chaudfontaine, les champs montueux. C.C.
- Alopecurus geniculatus* L. — Magnée, endroit humide. R.R.
- A. pratensis* L. — Magnée, Ayeneux, les prairies. A.C.
- A. agrestis* L. — Les moissons. C.C.
- Phleum pratense* L. — Très-commun dans toutes les prairies.
- Agrostis alba* L. — Romsée, bord d'un chemin. A.R.
- A. canina* L. — Magnée, Romsée, les haies. A.C.
- A. vulgaris* With. — Chaudfontaine, bords des chemins. C.C.
- A. Spica-venti* L. — Les moissons. C.C.
- Calamagrostis Epigeios* Roth. — Chaudfontaine, bois. A.R.
- Var. *Panicula nigro-purpurascens* Lej. — Forêt, bois. A.R.
- C. sylvatica* D.C. — Chaudfontaine, bois. A.R.
- Milium effusum* L. — Magnée, Vaux-sous-Chèvremont, Chaudfontaine, bois montueux. C.C.
- Sesleria caerulea* Ard. — Magnée, etc., coteaux secs, rochers. C.C.
- Arrhenatherum elatius* Mert. et Koch. — Magnée, Fond-de-Forêt, Chaudfontaine, prairies, bords des chemins, les haies. C.C.
- Aira coespitosa* L. — Chaudfontaine, bois; Magnée, le long des haies. C.C.
- A. flexuosa* — Chaudfontaine, bois montueux. C.C.
- Avena sativa* L. — Cultivé.
- A. orientalis* Schreb. — Romsée, avec l'*Av. sativa* L. R.R.
- A. strigosa* Schreb. — Romsée, avec l'*Av. Sativa*, L. R.R.
- A. fatua* L. — Magnée, avec l'*Avena sativa* A.R.
- A. sterilis* L. — Dans les mêmes champs que la précédente. R.R.
- A. pubescens* L. — Magnée, etc., coteaux incultes. C.C.
- A. flavescens* L. — Magnée, etc., les prairies, bords des chemins. C.C.
- A. caryophylla* Wigg. — Chaudfontaine, coteaux incultes. C.C.
- A. praecox* P.B. — Chemin qui traverse un bois montueux au-dessus de la Brouke près de Prayou. A.R.

Danthonia decumbens DC. — Chaudfontaine, Magnée, etc., bois montueux C.C.

Koeleria cristata Pers. — Forêt, pelouses. C. C.

Var. *Pyramidalis* Tin. *Fl. Luxemb.* — Magnée, Hez-d'Peket. A.C.

Holcus mollis L. — Chaudfontaine, bois. C.B.

Phragmites communis Trin. — Ayeneux, étangs du château de Wegimont. C.C.

Cynosurus cristatus L. — Domine dans toutes les prairies en même temps que le *Lolium perenne*.

Melica uniflora Retz. — Magnée, Fond-de-Forêt, lisière des bois montueux. A.C.

M. nutans L. — Chaudfontaine, lisière des bois. A.C.

M. ciliata L. — Magnée, Chaudfontaine, etc., les rochers calcaires. C.C.

Molinia coerulea Moench. — Fléron, une prairie humide; Chaudfontaine, etc., les bois. C.C.

Glyceria fluitans R.Br. — Magnée, Fond-de-Forêt, etc., les ruisseaux, les fossés. C.C.

G. spectabilis Mert. et Koch. — Jupille et Herstal, bords de la Meuse et des fossés. C.C.

G. rigida Sm. — Magnée et hameau du Trimotet (Forêt), rochers calcaires. A R.

Briza media L. — Magnée. Forêt, Romsée, pelouses arides. C.C.

Poa annua L. — Lieux cultivés, bords des chemins. C.C.

P. nemoralis L. — Magnée, etc., le long des haies. C.C.

P. Sudetica Haenke. — Chaudfontaine, bois montueux. R.R.

P. trivialis L. — Les moissons. C.C.

P. pratensis L. — Les prairies, le long des haies, etc. C.C.

P. compressa L. — Chaudfontaine, lieux arides et murs. A.C.

Dactylis glomerata L. Magnée, etc., les prairies et bords des chemins. C.C.

Michelaria bromoidea Dmrt.

Var. *glabra*, var. *villosa*. — Magnée, les moissons; quelquefois assez communs, quelquefois très-rares.

Nulle plante n'a donné lieu à autant de controverses que celle-ci relativement à sa détermination.

Depuis neuf ans, je cultive les deux variétés et elles n'ont varié dans aucun de leurs caractères génériques, ni même dans ceux qui les distinguent l'une de l'autre.

En attendant que je revienne dans une autre occasion sur l'histoire de cette graminée, je lui laisse le nom générique dérivé du nom de celui qui, le premier, la découvrit en Belgique, Pierre-Michel de Nessonvaux,

le compagnon de voyage de M. B. Du Mortier dans ses herborisations.
Bromus arvensis L. — Magnée, etc., bords des champs. C.C.

B. racemosus L. — Chaudfontaine, champs incultes; Magnée, bord d'un chemin A.C.

B. mollis L. — Magnée, etc., bords des chemins, les prairies, etc. C.C.

B. secalinus L.

Var. α . *glabra*.

Var. β . *pubescens*. — Fléron, les moissons. A.C.

B. nitidus Dmrt. — Magnée, etc., les moissons. C.C.

B. velutinus Schrad. — Magnée, etc., les moissons. C.C.

B. Sterilis L. — Bords des chemins, les rochers, etc., C.C.

B. asper. Murr. — Magnée, Fond-de-Forêt, etc., lisière des bois, les haies. C.C.

B. inermis Leyss. — Magnée, quelques prairies. R.R.

Festuca sciuroides Roth. — Chaudfontaine, pelouses arides. A.C.

F. pseudo-Myuros Soy. Willm. — Chaudfontaine, pelouses arides, souvent avec le précédent. R.R.

F. rubra L. — Magnée, Chaudfontaine, etc., les prairies et bords des chemins. C.C.

F. heterophylla L. — Forêt, Chaudfontaine, etc., les bois et les prairies. A.C.

F. duriuscula L. — Chaudfontaine, pelouses et bruyère. C.C.

F. tenuifolia Sibth. — Magnée, Trimotet, Chaudfontaine, pelouses arides et rochers. C.C.

F. arundinacea Schreb. — Chaudfontaine, Chênée, bords de la Vesdre. A.C.

F. pratensis Huds. — Magnée, etc., les prairies. C.C.

F. gigantea Vill. — Magnée, Fond-de-Forêt, etc., le long des haies et lisière des bois. C.C.

Brachypodium sylvaticum Roem. et Schult. — Les haies et les bois. C.C.

Lolium temulentum L. — Magnée, Chaudfontaine, etc., les moissons. C.C.

L. decipiens. Dmrt. — Magnée, les champs, les moissons. A.C.

L. perenne L. — Les prairies, et bords des chemins et des champs. C.C.

Var. α . *Tenue* Lej.

Var. β . *Viviparum* Lej.

Var. γ . *Cristatum* Bellyneck.

Var. δ . *Ramosum* Lej.

Var. α . Les prairies. C C..... Var. β . γ . δ . Magnée, Romsée, les bords des chemins. R.R.

L. Italicum. A. Br. — Magnée, parfois dans les champs de trèfle.

- L. multiflorum* Lam. — Magnée, champs de trèfle, souvent avec le précédent.
- Hordeum murinum* L. — Bords des chemins, le long des murs. C.C.
- H. secalinum* Schreb. — Magnée, bord d'un chemin. R.R.
- H. vulgare* L. — Cultivé fréquemment dans tous ces environs.
- H. hexastichon* L. — Fréquemment cultivé dans ces environs.
- H. distichon*. Var. *Caryopsidibus nudis*. — Plus rarement cultivé que les deux autres espèces.
- Elymus Europaeus* L. — Magnée, le long d'une haie. R.R.
- Secale cereale* L. — Très-fréquemment cultivé.
- Triticum repens* L. — Lieux cultivés, bords des chemins, etc. C.C.
- T. caninum* L. — Les haies et lisière des bois. C.C.
- T. vulgare* Vill. — Cultivé.
- T. turgidum* L. — Fréquemment cultivé à Magnée et Chaudfontaine.
- T. Spelta* L. — Cultivé.
- Nardus stricta* L. — Chaudfontaine, pelouses arides et bruyères. C.C.

FOUGÈRES.

- Ceterach officinarum* C. Bauh. — Chèvremont, rocher schisteux et vieux four à chaux. A.R.
- Polypodium vulgare* L. — Magnée, Forêt, Chaudfontaine, les rochers calcaires, bois montueux, les murs et les haies. C.C.
- P. Phaeopteris* L. — Forêt, bois montueux. A.C.
- P. Dryopteris* L. — Forêt, bois montueux. A.C.
- P. calcareum* Sm. — Magnée, Forêt, vieux murs et rochers calcaires. C.C.
- Pteris aquilina* L. — Magnée, pelouses montueuses; Chaudfontaine, etc., les bois. C.C.
- Struthiopteris Germanica* Willd. — Endroit humide à Colonster (Tilff). R.R.
- Blechnum Spicant* Roth. — Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, les bois. A.C.
- Scolopendrium officinale* Sm. — Forêt, les bois. C.C.
- Asplenium Filix-foemina* Bernh. — Magnée, etc., les haies et les bois. C.C.
- A. Trichomanes* L. — Les rochers, etc. C.C.
- A. septentrionale* Sw. — Prayou (Forêt), rochers schisteux. A.C.
- A. Breynii* Retz. — Nessonvaux, rochers calcaires. R.R.
- Cystopteris fragilis* Bernh. — Magnée, etc., les haies, les rochers calcaires ombragés. C.C.
- Polystichum Oreopteris* DC. — Prayou, bois près de la station du Troz. A.R.

- P. Filix-mas Roth. — Magnée, etc., les haies, les bois, etc.
P. spinulosum D.C. — Prayou près de la station, Chaudfontaine, bois montueux. A.R.
Aspidium aculeatum Sw. — Forêt, bois sur un rocher calcaire. A.C.
A. angulare Kit. — Fond-de-Forêt, bois sur un rocher schisteux. C.C.
Botrychium Lunaria Sw. — Forêt, pelouse aride sur un rocher calcaire. A.R.

RHIZOCARPÉES.

- Pilularia globulifera L. — Trouvé par M. Malaise à Ougrée dans un lieu inondé. R.R.

ÉQUISÉTACÉES.

- Equisetum arvense L. — Magnée, etc., les champs. C.C.
E. Telmateia Ehrh. — Fond-de-Forêt, ruisseau sur le bord d'un rocher.
E. palustre L. — Magnée, etc., les fossés. C.C.
E. hyemale L. — Chaudfontaine, bois. R.R.

LYCOPODIACÉES.

- Lycopodium clavatum L. — Chaudfontaine, bruyère en-dessous de la ferme de Sur-le-bois. A.C.
L. complanatum L. — Audoumont, bruyère. R.R.
L. Selago L. — Audoumont, bruyère. R.R.

Notice sur une nouvelle espèce de Cuscuta ; par
Ch. A. Strail, curé de Magnée.

Le 23 juillet 1863, j'ai rencontré à Chênée (Liège), dans un champ de trèfle, les deux formes de cuscutes signalées par M. F. Muller dans son spicilège de la flore bruxelloise.

Après avoir étudié ces deux formes dans toutes leurs phases, il m'est impossible de ne pas les considérer comme des espèces distinctes.

Outre que ces deux plantes ont chacune un aspect parti-